

সুমিত্ৰা টেঙাৰ খেতি



কৃপক কুমাৰ নাথ
পাৰভেজ আহমেদ

কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ
অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
তিনিচুকীয়া - ৭৮৬১২৫

সুমথিৰা টেঙ্গাৰ খেতি

টেঙ্গা ফলবোৰৰ ভিতৰত আন এবিধ উৎকৃষ্ট ফল হৈছে সুমথিৰা টেঙ্গা। ই এতি অতি লাভজনক খেতি। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিত সুমথিৰা টেঙ্গাৰ খেতি কৰি আন খেতিত কৈ যথেষ্ট লাভ আশা কৰিব পাৰি। উত্তৰ-পূৰ্ব অঞ্চলৰ ঘাইকে অসম, মেঘালয় ৰাজ্যত সুমথিৰা টেঙ্গাৰ খেতি কৰা হয়। ইয়াত নিহিত থকা ঘাই উপাদান বিলাক হ'ল- চাইত্ৰিক এচিদ, বাকলিত ফুকচাইদ ভিটামিন চি লগতে অনান্য ধাতবীয় মৌল যেনে কেলছিয়াম, ফচফৰাচ, আইৰন আদিয়েই প্ৰধান। সুমথিৰা টেঙ্গাৰ ৰস উৎকৃষ্ট পানীয় হিচাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়।

মাতি: অধিক জৈৱসাৰ থকা, পানী জমা নোহোৱা ওখ, বালিঁহীয়া মাতি এই খেতিৰ বাবে আৱশ্যক। বাগিছা খনত জলসিঞ্চনৰ তথা নিষ্কাশনৰ সুব্যৱস্থা থাকিব লাগে।

জাত: উৎকৃষ্ট জাত হৈছে- খলুৱা সুমথিৰা টেঙ্গা।

ৰোপন সামগ্ৰী: সুমথিৰা টেঙ্গা সাধাৰণতে বীজ আৰু কলি কলমৰ দ্বাৰা বংশ বিশ্বাৰ কৰা হয়।

মাতি প্ৰস্তুতকৰণ আৰু পুলি ৰোপন: সুমথিৰা টেঙ্গাৰ বাবে বাচনি কৰা মাতিডোখৰ দুই-তিনি বাৰ হাল-কোৰ মাৰি, মৈয়াই সমান কৰি ৫ মিটাৰ (১৫ ফুট) ব্যৱধানত শাৰী শাৰীকৈ বৰ্গক্ষেত্ৰ পদ্ধতিত একোত্তোকৈ গাঁত খানিদৰ লাগে। পুলি ৰোৱাৰ দুইমাহৰ আগতে গাঁত খানিদৰ পাৰিলে ভাল। প্ৰতিটো গাঁত ৭৫ ছে: মি: দীঘল, ৭৫ ছে:মি: বহল আৰু ৭৫ ছে: মি: দ হ'ব লাগে। গাঁতৰ ওপৰত আধা অংশৰ মাতি এফালে আৰু তলৰ আধা অংশৰ মাতি আনফালে থৰ লাগে। গাঁতবোৰ ওপৰৰ আধা অংশৰ মাতিৰ লগত ১০ কি: গ্ৰাম গোৰৰ বা পচন সাৰ, ১/২ কি: গ্ৰাম চুন দুই মাহৰ পিছত ভালকৈ মিহলাই লৈ পুনৰ ১ মাহ মান ৰাখি থৰ লাগে। বীজৰ পৰা গজোৱা পুলি যেতিয়া এক-ডেৰ বছৰ বয়স হ'ব আৰু কলি কলমৰ দ্বাৰা তৈয়াৰ কৰা পুলি যেতিয়া দুই-আড়ি বছৰ বয়স হৰ তেতিয়া পুলিবোৰ বাৰিষা কালত (মে মাহৰ পৰা আগষ্টলৈকে) প্ৰতিটো গাঁতত কৰ লাগে। ৰোৱতে গাঁতৰ মাজত প্ৰয়োজন সাপেক্ষে অকনমান মাতি গৰকি মাতিবোৰ হেচি দিব লাগে। পুলি ৰোৱাৰ পিছত পানী দিলে পুলিবোৰ মাতিত শীত্রে প্ৰতিষ্ঠাপিত হয়।

প্রতিপালন : পুলি বোরার পিছত প্রতিপালন হিচাবে বনবাত নির্বনি, শুকান বতৰ
হলে পানী যোগানৰ লগতে অপতৃন নিবাৰণৰ প্রতি দৃষ্টি ৰাখিব লাগে। বৰমুণৰ
বতৰত পানী জমা নহ'বৰ কাৰণে পানী ওলাই যাবৰ বাবে নলা আদিৰ ব্যৱস্থা
কৰিব লাগে। বোৱাৰ এবছৰ -ডেৰবছৰ পিচৰে পৰা মূল কাণ্ডত ওলোৱা পোখা
ডালবোৰ কাটি গছজোপা এনেকৈ ৰাখিব লাগে যাতে মাটিৰ পৰা ১ মিটাৰ
ওপৰলৈকে গছজোপাৰ মূল কাণ্ড ডালহে থাকে। মাজে মাজে বেমাৰী আৰু পোকে
আক্ৰমন কৰা, বতাহ বা অন্য কাৰণত ভগা আৰু বীজতৰীয়া ডালবোৰ কাটি,
কটা অংশত বৰ'ডো মলম নাইবা অন্য ভেকুৰ নাশক গুৰুত্বৰ মিশ্রণ সানি দিব
লাগে। নিয়মীয়াকৈ কীট-পতংগ আৰু বেমাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰি থাকিব লাগে।

সাৰ প্ৰয়োগ : সুমথিৰা টেঙ্গা গছত সাৰ গছৰ বয়স অনুপাতে প্ৰয়োগ কৰা হয়।
প্ৰথম বছৰ গাঁতত অলপ পৰিমানৰ (৫ কি: গ্ৰা:) পচন সাৰ মাটিৰ লগত মিহলাই
পুলিটো ৰূপ লাগে।

গছৰ বয়স	পচন সাৰ (কি: গ্ৰা:)	ইউৰীয়া (গ্ৰা:)	একক চুপাৰ ফচফেট (গ্ৰা:)	মিউটেট অৱ পটাছ (গ্ৰা:)
২য় বছৰ	৫	৩৩০	৭৫০	১৬৭
৩য় বছৰ	১০	৬৬০	১৫০০	৩৩৪
৪ৰ্থ বছৰ	১৫	৯৯০	২২৫০	৫০০
৫ম বছৰ	২০	১৩২০	৩০০০	৬৬৮
৬ষ্ঠ বছৰ	২৫	১৬৫০	৩৭৫০	৮৩৫
মা				
ওপৰৰ				
বয়সৰ				

সাৰখিনি সমানে দুভাগ কৰি এভাগ ফেৰুৱাৰী - মাৰ্চ মাহত আৰু আনটো
ভাগ ছেপেৰৰ - অক্টোবৰ মাহত প্ৰয়োগ কৰিব লাগে। গছজোপাৰ বয়স অনুযায়ী
গুৰিৰ পৰা ১৫-৪৫ ছে: মি: আতৰত গছে আৰবি থকা গোটেই ঠাইখিনিত
দিবলগীয়া সাৰখিনি সমান ভাৱে পৰাকৈ চতিয়াই পিচত পাতলীয়াকৈ কোৱ মাৰি
মাটিৰ লগত মিহলাই দিব লাগে। লক্ষ্য কৰিব লাগে যে সাৰ প্ৰয়োগ কৰিবৰ
সময়ত মাটিখিনিত বন-বাত নাথাকে আৰু মাটিত জীপ থাকে।

সংমিশ্রণ শস্য: সাধাৰণতে পুলি ৰোৱাৰ ৭ বছৰ বয়সৰ পৰা গচ্ছত ফল লাগিবলৈ ধৰে। এই সময়ছোৱাত গচ্ছৰ মাজত খালি থকা ঠাইখিনিত অন্তর্ভুক্তী শস্য হিচাবে ত্রুষ্ণকালীন শস্য যেনে মাহজাতীয় শস্য, অমিতা, মাটিকঠাল আদিৰ খেতি কৰি কিছু উপাৰ্জন কৰিব পাৰি। এতিয়া কিছুমান ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কে সুমথিৰা টেঙ্গো বাৰীত চাহ খেতি কৰি যথেষ্ট উপকৃত হৈছে। চাহ আৰু সুমথিৰা টেঙ্গোৰ অন্ত আৰু সংমিশ্রিত খেতিত খেতিয়ক এজনে চাহ খেতিৰ পৰা মার্চ মাহৰ পৰা নৱেন্দ্ৰৰ মাহলৈ আৰু সুমথিৰা টেঙ্গোৰ পৰা নৱেন্দ্ৰৰ মাহৰ পৰা জানুৱাৰী মাহলৈ উপাৰ্জন পায়, যিটো আন কোনো খেতিৰ বাবে সম্ভৱ নহয়।

ফল চপোৱা: সাধাৰণতে ফলবোৰ বৰণ ধৰাৰ লগে লগে ছিঙিব লাগে। ফল চপোৱাৰ সময়ত যাতে কোনো আঘাত নাপায় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগে। বৰ্তমান সময়ত বজাৰত সুমথিৰা টেঙ্গোৰ চাহিদালৈ চাই খেতিয়ক সকলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিত খেতি কৰি আৰ্থিক ভাবে লাভান্বিত হৰ পাৰে।